

# Good 楽薬袋＋薬情 (OP) 資料

2012. 04. 26

## ■ 薬袋(表)と薬情(裏)の印字

内服薬(表)

病院名：中央診療所  
 診療科：内科  
 医師名：中央 良男 先生  
 調剤日：2012/03/19  
 I D : 302

**内用薬**

朝  
食直後

ふくわ けこ  
**中央 花子 様**  
 1日1回 朝食後にお飲みください

7日分

薬剤名	剤形	起	朝	昼	夕	寝	単位
混合薬 (ピオスミン配合散) (アデホスコーク顆粒 10%)			1				粉
セフゾンカプセル 100mg			1				カプセル
タスモリン錠 1mg			1				錠
ノルバスク錠 5mg			1				錠
ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用)			1				粉

**〇〇〇薬局**  
 〇〇区〇〇町1-1-1  
 TEL 03-1111-2222 / FAX 03-1111-2222

薬剤師

内服薬(裏)

混合薬  
 後発医薬品はレベニス (薬価6.2円) があります  
 ◆アデホスコーク顆粒 10% (1日1.2g) (7日分) (薬価28.3円)  
 効き① 血行をよくし、脳、心臓や胃腸の働きを改善します。また、めまい等を改善します。  
 注意① 次のような症状に気付いたら、早めに医師または薬剤師に相談して下さい。→発疹、発赤、蕁麻疹  
 後発医薬品は存在しません  
 ◆セフゾンカプセル 100mg (1日1C) (7日分) (薬価70.6円)  
 効き① 細菌の増殖を抑え、感染症を治療します。  
 注意① 尿が赤味がかかることがあります。  
 後発医薬品は存在しますが取り扱っておりません  
 ◆タスモリン錠 1mg (1日1錠) (7日分) (薬価5.6円)  
 効き① 神経の働きを調整し、手足のふるえ、筋肉のこわばりを改善します。  
 注意① 眠気、物が見えにくい、注意力の低下等が起こる事がありますので、乗物または機械等の運転操作の際はご注意ください。  
 本医薬品は後発医薬品です  
 ◆ノルバスク錠 5mg (1日1錠) (7日分) (薬価64.9円)  
 効き① 血管を拡げ、血圧を下げます。また、心臓の負担を軽くし、狭心症発作を防ぎます。  
 注意① 血圧の低下によるめまい等が起こる事がありますので、乗物または機械等の運転操作の際は注意して下さい。  
 後発医薬品はアムロジピン錠 5mg 「オーハラ」 (薬価44.2円) があります  
 ◆ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用) (1日2.5g) (7日分) (薬価9.3円)  
 効き① 風邪、頭痛、肩こり、筋肉痛、関節の痛みやはれを改善する働きがあります。  
 注意① 湿気を避け涼しい所で保管して下さい。  
 本医薬品は漢方や生薬です  
 ・医薬品情報 <http://www.info.pmda.go.jp/ippan.html>

外用薬(表)

病院名：中央診療所  
 診療科：内科  
 医師名：中央 良男 先生  
 調剤日：2012/03/19  
 I D : 302

**外用薬**

ふくわ けこ  
**中央 花子 様**  
 1日2回 両眼に点眼して下さい

薬剤名	剤形	総量	単位
リンデロン点眼液 0.01%		5	ml

**〇〇〇薬局**  
 〇〇区〇〇町1-1-1  
 TEL 03-1111-2222 / FAX 03-1111-2222

薬剤師

外用薬(裏)

無色澄明点眼剤  
 後発医薬品は存在しません  
 ・医薬品情報 <http://www.info.pmda.go.jp/ippan.html>

〇〇〇薬局  
 〇〇区〇〇町1-1-1  
 TEL 03-1111-2222 / FAX 03-1111-2222

# ■ A4白紙用紙 薬袋(左)＋薬情(右)の印字

※A4白紙のコピー用紙に印字し半分に折ってビニール薬袋に入れます

医院名：中央診療所  
 診療科：内科  
 医師名：中央 良男 先生  
 調剤日：2012/03/19  
 I D : 302

内用薬



食直後

処方科 内科  
 中央 花子 様

1日1回 朝食後にお飲みください

7日分

薬剤名	剤形	起	朝	昼	夕	夜	単位
混合薬 (ピオスミン配合散) (アデホスコークワ顆粒10%)			1				粉
セフゾンカプセル100mg			1				カプセル
タスモリン錠1mg			1				錠
ノルバスク錠5mg			1				錠
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)			1				粉



〇〇〇薬局

〇〇区〇〇町1-1-1

TEL 03-1111-2222 / FAX 03-1111-2222

薬剤師

**<お薬の説明> 1日1回 朝食後にお飲みください**

**混合薬**

◆ピオスミン配合散(1日0.8g)(7日分)(薬価6.2円)

**働** 腸内細菌のバランスを整え、腸の調子を改善します。

**注** 次のような症状に気付いたら、早めに医師または薬剤師に相談して下さい。→発疹、発赤、蕁麻疹

後発医薬品はレベニンS(薬価6.2円)があります

◆アデホスコークワ顆粒10%(1日1.2g)(7日分)(薬価28.3円)

**働** 血行をよくし、脳、心臓や胃腸の働きを改善します。また、めまい等を改善します。

**注** 次のような症状に気付いたら薬の服用をやめ、すぐに医師または薬剤師に連絡して下さい。→発疹

後発医薬品は存在しません

◆セフゾンカプセル100mg(1日10)(7日分)(薬価70.6円)

**働** 細菌の増殖を抑え、感染症を治療します。

**注** 尿が赤味がかかる事があります。

後発医薬品は存在しますが取り扱っておりません

◆タスモリン錠1mg(1日1錠)(7日分)(薬価5.6円)

**働** 神経の働きを調整し、手足のふるえ、筋肉のこわばりを改善します。

**注** 眠気、物が見えにくい、注意力の低下等が起こる事がありますので、乗物または機械等の運転操作の際はご注意ください。

本医薬品は後発医薬品です

◆ノルバスク錠5mg(1日1錠)(7日分)(薬価64.9円)

**働** 血管を拡げ、血圧を下げます。また、心臓の負担を軽くし、狭心症発作を防ぎます。

**注** 血圧の低下によるめまい等が起こる事がありますので、乗物または機械等の運転操作の際は注意して下さい。

後発医薬品はアムロジピン錠5mg「オーハラ」(薬価44.2円)があります

◆ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(1日2.5g)(7日分)(薬価9.3円)

**働** 風邪、頭痛、肩こり、筋肉痛、関節の痛みやはれを改善する働きがあります。

**注** 湿気を避け涼しい所で保管して下さい。

本医薬品は漢方や生薬です

・医薬品情報 <http://www.info.pmda.go.jp/jppan.html>


医院名：中央診療所  
 診療科：内科  
 医師名：中央 良男 先生  
 調剤日：2012/03/19  
 I D : 302


頓服薬

処方科 内科  
 中央 花子 様

(発熱時)

5回分

薬剤名	剤形	1回量	単位
カロナール錠300		1	錠



〇〇〇薬局

〇〇区〇〇町1-1-1

TEL 03-1111-2222 / FAX 03-1111-2222

薬剤師

**<お薬の説明> (発熱時)**

◆カロナール錠300(1回1錠)(5回分)(薬価9.7円)

**働** 炎症を抑え、痛みをやわらげます。発汗を促し熱を下げます。

**注** ①過去に喘息の発作を起こした事のある方は、医師に相談して下さい。②アルコールは、薬の副作用を強める事がありますので、注意して下さい。③総合感冒剤や解熱鎮痛剤等との併用は避けて下さい。

本医薬品は後発医薬品です

・医薬品情報 <http://www.info.pmda.go.jp/jppan.html>

# ■ A 4 白紙用紙 薬袋の裏に印字できなかった情報の印字

チュウカ ハコ <b>中央 花子 様</b> の <お薬の説明> です 生年月日: S48/03/04 年齢: 39歳 性別: 女 ID: 302	受付no: 1 医療機関名: 中央診療所 調剤日: H24/03/19	1/1									
診療科: 内科 医師名: 中央 良男 先生 受付no: 1											
<b>内用薬 7日分</b> 1日1回 朝食後にお飲みください		 <b>食直後</b>									
 淡赤 硬カプセル 339	◆セフゾンカプセル100mg (1日1C)(7日分)(薬価70.6円) <b>働き</b> ①細菌の増殖を抑え、感染症を治療します。 <b>注意</b> ①尿が赤味がかかる事があります。 後発医薬品は存在しますが取り扱っておりません	単位【カプセル】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">朝</td> <td style="text-align: center;">昼</td> <td style="text-align: center;">夕</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>起床時</td> <td>就寝前</td> <td>1回量</td> </tr> </table>	朝	昼	夕	1			起床時	就寝前	1回量
朝	昼	夕									
1											
起床時	就寝前	1回量									
 白 素錠 Y TA1	◆タスモリン錠1mg (1日1錠)(7日分)(薬価5.6円) <b>働き</b> ①神経の働きを調整し、手足のふるえ、筋肉のこわばりを改善します。 <b>注意</b> ①眠気、物が見えにくい、注意力の低下等が起こる事がありますので、乗物または機械等の運転操作の際はご注意ください。 本医薬品は後発医薬品です	単位【錠】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">朝</td> <td style="text-align: center;">昼</td> <td style="text-align: center;">夕</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>起床時</td> <td>就寝前</td> <td>1回量</td> </tr> </table>	朝	昼	夕	1			起床時	就寝前	1回量
朝	昼	夕									
1											
起床時	就寝前	1回量									
<b>頓服薬 5回分 (発熱時)</b> 診療科: 内科 医師名: 中央 良男 先生 受付no: 1											
 白 素錠 SD 113	◆カロナール錠300 (1回1錠)(5回分)(薬価9.7円) <b>働き</b> ①炎症を抑え、痛みをやわらげます。発汗を促し熱を下げます。 <b>注意</b> ①過去に喘息の発作を起こした事のある方は、医師に相談して下さい。②アルコールは、薬の副作用を強める事がありますので、注意して下さい。③総合感冒剤や解熱鎮痛剤等との併用は避けて下さい。 本医薬品は後発医薬品です	単位【錠】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">1回量</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>	1回量	1							
1回量											
1											
<b>外用薬</b> 診療科: 内科 医師名: 中央 良男 先生 受付no: 1											
1日2回 両眼に点眼して下さい											
 無色透明 点眼剤	◆リンデロン点眼液0.01% (1調剤5ml)(薬価47.6円) <b>働き</b> ①眼の炎症やアレルギーを抑え、充血、痒み等を改善します。 <b>注意</b> ①光を避けて保管して下さい。 後発医薬品は存在しません	単位【ml】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">総量</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table>	総量	5							
総量											
5											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 45%; border: 1px solid black; padding: 5px;">                     - 患者様へ -                      ・薬の働きは一般的なものであって症状によっては異なる使われ方もあります                      ・他の医療機関への受診や薬局で薬をお求めになる時はこの用紙を見せて下さい                      ・不明な点がありましたらご連絡なくお問い合わせ下さい                      ・医薬品情報 <a href="http://www.info.pmda.go.jp/ippan.html">http://www.info.pmda.go.jp/ippan.html</a> </td> <td style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="width: 35%; vertical-align: middle;"> <b>〇〇〇薬局</b>                      〇〇区〇〇町1-1-1                      TEL 03-1111-2222 / FAX 03-1111-2222                 </td> <td style="width: 5%; text-align: center; vertical-align: middle;">                 薬剤師             </td> </tr> </table>			- 患者様へ - ・薬の働きは一般的なものであって症状によっては異なる使われ方もあります ・他の医療機関への受診や薬局で薬をお求めになる時はこの用紙を見せて下さい ・不明な点がありましたらご連絡なくお問い合わせ下さい ・医薬品情報 <a href="http://www.info.pmda.go.jp/ippan.html">http://www.info.pmda.go.jp/ippan.html</a>		<b>〇〇〇薬局</b> 〇〇区〇〇町1-1-1 TEL 03-1111-2222 / FAX 03-1111-2222	薬剤師					
- 患者様へ - ・薬の働きは一般的なものであって症状によっては異なる使われ方もあります ・他の医療機関への受診や薬局で薬をお求めになる時はこの用紙を見せて下さい ・不明な点がありましたらご連絡なくお問い合わせ下さい ・医薬品情報 <a href="http://www.info.pmda.go.jp/ippan.html">http://www.info.pmda.go.jp/ippan.html</a>		<b>〇〇〇薬局</b> 〇〇区〇〇町1-1-1 TEL 03-1111-2222 / FAX 03-1111-2222	薬剤師								